

## Gebrauchsinformation

# Kytta-Salbe® f

Wirkstoff: Beinwellwurzel-Fluidextrakt



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g Kytta-Salbe® f enthalten:  
Beinwellwurzel-Fluidextrakt (1:2) 35,0 g,  
(Auszugsmittel: Ethanol 60 Vol.-%).

Sonstige Bestandteile:

2-Phenoxyethanol-(butyl, ethyl, isobutyl, methyl, propyl) (4-hydroxybenzoat), Cetylstearylalkohol, Glycerol-1-stearat, Natriumdodecylsulfat, Erdnussöl, gereinigtes Wasser, Lavendelöl, Fichtennadelöl, Parfümöl Spezial PH 032791.

### Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 50 g Creme (N1)  
Packung mit 100 g Creme (N2)  
Packung mit 150 g Creme (N3)

### Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Der in Kytta-Salbe f enthaltene Wirkstoff Beinwellwurzel-Fluidextrakt dient zur äußerlichen Anwendung gegen Entzündungen, Schwellungen und Schmerzen.

### Pharmazeutischer Unternehmer

Merck Selbstmedikation GmbH  
Röblerstraße 96  
64293 Darmstadt  
Tel.-Nr.: 0 61 51/8 56-260  
Fax-Nr.: 0 61 51/8 56-203  
www.merckselbstmedikation.de

### Hersteller

Merck Kommanditgesellschaft  
auf Aktien + Co  
Werk Spittal  
A-9800 Spittal / Drau

### Anwendungsgebiete

Stumpfe Verletzungen wie Prellungen, Zerrungen, Quetschungen, Verstauchungen.

Zur Anwendung auf der Haut.

### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Kytta-Salbe f nicht anwenden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Beinwell, Parabene oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe von Kytta-Salbe f darf das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die Anwendung in der Schwangerschaft sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Kytta-Salbe f soll nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder auf offene Wunden aufgetragen werden.

Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen.

Worauf müssen Sie noch achten?

Aufgrund des Gehaltes an Methyl-, Ethyl, und Propyl-4hydroxybenzoat (Parabene) kann es zu allergischen Reaktionen, auch mit Verzögerung kommen.

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann die häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

Was sollte bei Kindern beachtet werden?

Zur Anwendung von Kytta-Salbe f bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Daher sollte Kytta-Salbe f bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher keine bekannt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Kytta-Salbe f nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Kytta-Salbe f sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Kytta-Salbe f anwenden?

Je nach Größe der zu behandelnden Körperstelle und nach Stärke der Beschwerden, zwei- bis viermal täglich ca. 1,2 – 6 g (entspricht einem Salbenstrang von 4 – 18 cm) auftragen.

Wie und wann sollten Sie Kytta-Salbe f anwenden?

Kytta-Salbe f auf die zu behandelnden Körperstellen auftragen und sorgfältig einmassieren. Bei stärkeren Beschwerden kann ein Salbenverband angelegt werden. Dazu werden einmal täglich 10 – 20 g Salbe aufgetragen und mit geeignetem Verbandsmaterial abgedeckt.

Wie lange sollten Sie Kytta-Salbe f anwenden?

Die Anwendung kann bis zum Abklingen der Beschwerden oder nach Anweisung des Arztes weitergeführt werden.

### Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Kytta-Salbe f auftreten?

Wie alle Arzneimittel kann Kytta-Salbe f Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b> Mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b> Mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b> Mehr als 1 von 1.000 Behandelten
<b>Selten:</b> Mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b> 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle


Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

weitere interessante Informationen und Tipps zum Thema „Muskel- und Gelenksbeschwerden“ haben wir für Sie in einem **kostenfreien** Ratgeber zusammengestellt.

Fordern Sie den Kytta-Ratgeber „Muskel- und Gelenksbeschwerden“ **gratis** an:

Merck Selbstmedikation GmbH  
Kytta-Patienten-Service  
Röblerstr. 96  
64293 Darmstadt  
Tel: 061 51 / 8 56-260, Fax: 061 51 / 8 56-203

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch im Internet unter [www.kytta.de](http://www.kytta.de).



Bitte senden Sie mir kostenfrei den Kytta-Ratgeber „Muskel- und Gelenksbeschwerden“

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Kytta-Salbe f kann in seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen. Sie äußern sich meist am Ort der Behandlung im Auftreten von Rötung, Knötchen- und Bläschenbildung, sowie Juckreiz. Aufgrund des Gehaltes an Erdnussöl kann es in seltenen Fällen zu lokalen Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sie sollten die Behandlung abbrechen und gegebenenfalls einen Arzt über die Fortsetzung der Behandlung befragen.

### Haltbarkeit

Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel bzw. auf der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem angegebenen Datum!

### Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses:

1 Jahr

Wie ist Kytta-Salbe f aufzubewahren?

Arzneimittel bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerungshinweis:

Nicht über 30°C lagern.

### Stand der Information

Januar 2006

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

